

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Rerata kadar VE-cadherin pada anak dengan DD adalah $4,58 \pm 0,94$ ng/ml
2. Rerata kadar VE-cadherin pada anak dengan DBD tanpa syok adalah $5,51 \pm 0,42$ ng/ml
3. Rerata kadar VE-cadherin pada anak dengan DBD yang disertai syok adalah $8,52 \pm 2,56$ ng/ml
4. Terdapat hubungan bermakna antara kadar VE-cadherin dengan derajat infeksi dengue pada anak berdasarkan klasifikasi WHO 2011 dimana peningkatan kadar VE-cadherin sesuai dengan derajat penyakit infeksi dengue.

7.2 Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui nilai *cut-off* point dari kadar VE-cadherin pada berbagai derajat penyakit infeksi dengue yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi prognosis dan meningkatkan kewaspadaan untuk tatalaksana lebih awal dan tepat.
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan sensitivitas dan spesifisitas VE-cadherin dalam mengidentifikasi derajat penyakit akibat infeksi dengue.
3. Perlunya ketersediaan alat pemeriksaan VE-cadherin di laboratorium untuk bisa dijadikan terapan dalam pemeriksaan rutin.